

## بادی پرپ / بادی پرپ C



محلول آنتی سپتیک سریع با خاصیت ماندگار

ضد عفونی و آماده سازی سریع پوست قبل از عمل جراحی

حاوی ایزوپروپانول ۷۰ درصد و کلرهگزیدین ۲ درصد

\* محصول بادی پرپ بی رنگ است و بادی پرپ C حاوی رنگ می باشد.

### خصوصیات

- دارای مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو
- دارای تاییدیه EN12791 (استاندارد اروپایی ویژه اسکراب جراحی)
- دارای طیف اثر ضد میکروبی علیه باکتری، مخمر و ویروس منطبق بر EN13624، EN13727، EN1040 و EN14476
- حاوی ماده کلرهگزیدین دی گلوکونات به جهت ایجاد اثرات پایدار ضد عفونی کننده
- ضد عفونی سریع و مؤثر بدون نیاز به آبکشی
- ضد عفونی مؤثرتر و پایدارتر نسبت به محصولات مشابهی مانند بتادین
- حاوی مواد نرم کننده و محافظت کننده پوست بدن
- دارای تاییدیه عدم حساسیت پوستی

### ترکیبات

(مقدار ترکیب در ۱۰۰ گرم فرآورده)

Isopropanol .....	70% (v/w)
Chlorhexidine digluconate .....	2% (w/w)
Excipients .....	up to 100%

### مشخصات محصول


	Body prep	Body prep c
<b>Color/Form</b>	Clear colorless solution	Clear & dark red solution
<b>pH</b>	5.5 - 6.5	5.5 - 6.5
<b>Shelf Life</b>	3 years	3 years
<b>Density</b>	0.88 - 0.92 g/ml	0.88 - 0.92 g/ml

## بسته بندی صادراتی محصول

حجم	تعداد در کارتن	تعداد در پالت
125 m	90 bottels per carton	40 cartons per pallet
250 mL	30 bottels per carton	30 cartons per pallet
500 mL	20 bottels per carton	36 cartons per pallet
1 L	12 gallons per carton	44 cartons per pallet

### دستور العمل مصرف

- محلول بادی پریپ را روی نواحی مورد نظر پوست اسپری کرده و با پنبه یا گاز استریل به صورت چرخشی محلول را در ناحیه مورد نظر مالش داده و به مدت ۳۰-۶۰ ثانیه صبر کنید تا محلول از روی پوست خشک شود. به این ترتیب پوستی ضد عفونی شده، نرم و آماده عمل جراحی فراهم خواهد شد.
- در صورت وجود آلودگی های خارجی، ابتدا پوست را تمیز کرده سپس از محلول آنتی سپتیک بادی پریپ استفاده کنید.
- در صورت استفاده از الکتروکوتر، نسبت به تبخیر کامل محلول و خشک شدن پوست اطمینان حاصل کنید.



### طیف اثر ضد میکروبی

#### Meets European Standards

##### Bactericidal Activity

According to EN 1040 Staphylococcus. aureus/ATCC6538  
(contact time: 3 min) Pseudomonas. aeruginosa/ATCC9027

According to EN 13727 Staphylococcus. aureus/ATCC6538  
(contact time: 3 min) Enterococcus. hirae/ATCC10541  
Pseudomonas. aeruginosa/ATCC9027

According to EN 12791 Resident microbial flora  
(contact time: 3 min)

##### Virucidal Activity

According to EN 14476 Murine norovirus, Strain S99 Berlin,  
(contact time: 3 min) RVB-0651

##### Yeasidial Activity

According to EN 13624 Candida.albicans/ATCC10231  
(contact time: 3 min)

\* طیف اثر ضد میکروبی به طور مرتب توسط بخش علمی شرکت پایش و به روز رسانی می شود لذا جهت اطلاع از آخرین استانداردهای تایید شده فرآورده با نمایندگان مجاز شرکت تماس حاصل فرمایید.

نشانی: تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده  
دامپزشکی مجتمع کاوه، بلوک B، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۵  
تلفن: ۶۶۵۸۱۲۶۹ ، ۵ - ۶۶۵۸۱۲۹۴ (۰۲۱)  
**به بان شیمی**  
شرکت دارویی —  
[www.behban.com](http://www.behban.com)

Latest revision: May 1, 2022

# BODYPREP



### نکات فنی و ایمنی

- این محصول جهت استعمال موضعی بوده و خوراکی نمی باشد. از آشامیدن و بلعیدن محصول اجتناب شود.
- از تماس با مغز، پرده مننژ، چشم و گوش میانی اجتناب شود.
- روی زخم های باز پوست استفاده نشود.
- از باز گذاشتن درب محصول خودداری شود.
- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه نگهداری شود.
- در صورت بلع اتفاقی، سریعاً به پزشک مراجعه شود.
- محصول قابل اشتعال است. دور از گرما، شعله، منابع جرقه و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
- بدلیل واکنش های شیمیایی کلرهگزیدین با کلر آزاد یا یون کلر موجود در هیپوکلریت سدیم و ایجاد رنگ زرد مایل به قهوه ای روی البسه آغشته شده با کلرهگزیدین، برای شستشو و لکه زدایی البسه در هنگام استفاده از ترکیبات حاوی کلرهگزیدین، از آب اکسیژنه یا پر استیک اسید (پرسیدین) استفاده شود.
- برای نتیجه بهتر، پیش شستشو با آب سرد (زیر ۴۰ درجه) و سپس استفاده از ترکیب پرسیدین توصیه می شود.

